

レジメン番号 **b064** レジメン名 **Pola+R-CHP**

1クール 3週 催吐リスク(レジメン) 中等度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
エンドキサン注	750mg/m ²	day1
ドキシソルビシン注	50mg/m ²	day1
ポライビー注	1.8mg/kg	day1
プレドニゾロン錠	100mg/body	day1~5
リツキサン注	375mg/m ²	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
エンドキサン注	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、出血性膀胱炎、悪心・嘔吐 出血性膀胱炎予防として水分負荷
ドキシソルビシン注	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、脱毛、着色尿 アントラサイクリン系薬剤として生涯投与量制限あり
プレドニゾロン錠	—	—
ポライビー注	非炎症性抗がん剤	Infusion reaction、骨髄抑制、肝機能障害、腫瘍崩壊症候群 前投薬: 抗ヒスタミン・副腎皮質ホルモン・解熱鎮痛剤
リツキサン注	非炎症性抗がん剤	アナフィラキシー、肺障害、劇症肝炎、間質性肺炎 前投薬: 抗ヒスタミン・副腎皮質ホルモン・解熱鎮痛剤