

レジメン番号 p054 レジメン名 Nivo+Ipi+CBDCA+PTX

1クール 6週 催吐リスク(レジメン) 高度催吐リスク

| 薬品名 | 用量 | 投与日 |
|----------|----------------------|---------|
| オプジーボ注 | 360mg/body | day1,22 |
| ヤーボイ注 | 1mg/kg | day1 |
| パクリタキセル注 | 200mg/m ² | day1,22 |
| カルボプラチン注 | AUC6 | day1,22 |

| | 血管への影響 | 副作用/主な特徴 |
|----------|----------|---|
| オプジーボ注 | 非炎症性抗がん剤 | irAe(下痢・大腸炎、内分泌障害、間質性肺炎、1型糖尿病など) |
| カルボプラチン注 | 炎症性抗がん剤 | 骨髄抑制、腎機能障害 Calvertの式より投与量算出 |
| パクリタキセル注 | 壊死性抗がん剤 | 骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛 アルコール過敏注意、CYP2C8・CYP3A4で代謝、DEHPフリールート使用 |
| ヤーボイ注 | 非炎症性抗がん剤 | irAe(下痢・大腸炎、内分泌障害、間質性肺炎、1型糖尿病など) |